

# Impacto del consumo de drogas de uso recreativo en variables relacionadas con la salud en personas con VIH

V Castro<sup>1,2</sup>, L Leal<sup>3</sup>, N Garin<sup>4</sup>, JL Casado<sup>5</sup>, S Cenoz<sup>6</sup>, A Jaén<sup>7</sup>, MJ Galindo<sup>8</sup>, **MJ Fuster-Ruiz de Apodaca<sup>9</sup>**

<sup>1</sup>H. Comarcal de la Marina Baixa, Villajoyosa, <sup>2</sup> Programa de Farmacia de la Universidad de Granada, <sup>3</sup>Hospital Clínico, Barcelona <sup>4</sup>Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona <sup>5</sup>Hospital Ramón y Cajal, Madrid <sup>6</sup>ViiV Healthcare, Madrid, <sup>7</sup>Fundació Recerca i Docència Mutua Terrassa, Barcelona, <sup>8</sup>H. Clínico, València, <sup>9</sup>**SEISIDA, Madrid**



8 de Noviembre 2018

# DISEÑO INVESTIGACIÓN

**Estudio 1**  
**CUALITATIVO**

Identificación de dominios  
relevantes a explorar  
Diseño de Encuesta

**N = 21**

**Estudio 2**  
**CUANTITATIVO**  
Encuesta transversal

Análisis de la prevalencia de  
uso recreativo de drogas y  
otros medicamentos en  
personas con VIH

Análisis de las estrategias de  
manejo de las interacciones en  
PVIH y del impacto de las  
drogas en la calidad de vida

**N = 1401**

**Estudio 3**  
**OBSERVACIONAL TRANSVERSAL Y  
DE COHORTES RETROSPECTIVAS**

Repercusión clínica del uso de  
drogas y de las interacciones

Implicaciones económicas del  
uso de drogas y de las  
interacciones

**N = 276**

**Diseño mixto exploratorio secuencial**



# DISEÑO INVESTIGACIÓN

Se presentan en esta comunicación los datos de la encuesta transversal que analiza el impacto del uso de drogas en variables relacionadas con la salud medidas con PROs:

- ✓ Adherencia al TAR (CEAT-VIH)
- ✓ Calidad de vida (WHOQOL-HIV-BREF)
- ✓ Bienestar psicológico (GHQ-12)
- ✓ ITS padecidas en el último año
- ✓ Uso recursos sanitarios

**Estudio 3**  
**OBSERVACIONAL TRANSVERSAL Y DE COHORTES RETROSPECTIVAS**



Repercusión clínica del uso de drogas y de las interacciones



Implicaciones económicas del uso de drogas y de las interacciones


**N = 276**

**Diseño mixto exploratorio secuencial**




# METODOLOGÍA

Estudio observacional de cohortes retrospectivo multicéntrico ( 4 hospitales\*)




CRITERIOS DE SELECCIÓN/EXCLUSIÓN DE LOS PACIENTES:



\* H. Comarcal Marina Baixa, H. Clínico BCN, H. Sant Pau, H. Ramón y Cajal.

# PARTICIPANTES

Más jóvenes (41 vs. 48 años,  $p < .0001$ )  
 Más HSH (92% vs. 75%,  $p < .0001$ )  
 Sin relación estable (66% vs. 53%,  $p < .05$ )  
 Más empleados (74% vs. 56%,  $p < .0001$ )  
 Menos tiempo de diagnóstico (11 vs 14 años aprox,  $p < .01$ )



# RESULTADOS

## Uso drogas

- ✓ Prevalencia: poppers (80.8%), cocaína (69.9%), cannabis (62.3%) y GHB (55.5%).
- ✓ Frecuencia:  $5.3 \pm 3.2$  (rango 1-14)

## Interacciones

- ✓ Interacciones potenciales en 53.2% pacientes (40.3% moderadas)
- ✓ 301 potenciales interacciones moderadas en dichos pacientes
- ✓ IPs droga-paciente más frecuentes: cocaína (42%), cannabis (29%), ketamina (17.5%), GHB (17%), MDMA (15%)

## ITS y PROs

- ✓ Mayor prevalencia ITS en consumidores (48.6% vs. 16.9%). ITS más frecuentes: sífilis (36.3% vs. 10%) y gonorrea (15% vs. 1.5%)
- ✓ Menor adherencia TAR en consumidores ( $M = 87.8$  vs.  $90.6$ ;  $p < .001$ )
- ✓ Menor calidad de vida en consumidores ( $M = 71.5$  vs.  $77.9$ ;  $p < .0001$ )
- ✓ Más ansiedad ( $1.93$  vs.  $1.78$ ;  $p < .01$ ) y depresión ( $2$  vs.  $2.2$ ;  $p < .01$ ) en consumidores

## R.Sanitarios

- ✓ Mayor uso de servicio urgencias en consumidores (46.6% vs. 31.5%)
- ✓ Mayor nº ingresos hospitalarios en consumidores (15.1% vs. 7.7%)



# CONCLUSIONES

- ✓ El consumo de drogas recreativas tiene un impacto negativo en variables relacionadas con la salud de personas con VIH, incluyendo variables clínicas, de calidad de vida y bienestar psicológico, así como un mayor consumo en los recursos sanitarios.
- ✓ Estos resultados recogidos con medidas auto-reportadas están siendo analizados junto con datos recogidos a través de historias clínicas.
- ✓ Deberían ponerse en marcha intervenciones para dar respuesta al uso problemático del uso de drogas y así mejorar los resultados en salud de las personas con VIH

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

